

In the treatment of cUTI

ARM YOURSELF FOR BATTLE

AGAINST SERIOUS GRAM-NEGATIVE
PATHOGENS WITH **PHINPEN**



PHINPEN **MEROPENEM**

For IV Injection

1gm

1 Vial + 20ml
Sterile water for injection
(Diluent)

I.V.

500mg

1 Vial + 10ml
Sterile water for injection
(Diluent)

I.V.



NAWAN
LABORATORIES (PVT.) LTD.

In the treatment of cUTI

ARM YOURSELF FOR BATTLE AGAINST SERIOUS GRAM-NEGATIVE PATHOGENS WITH PHINPEN


Composition:

Each vial contains:
Meropenem (as trihydrate) 500mg
(Blended with Sodium Carbonate)
(USP Specifications)



Composition:

Each vial contains:
Meropenem (as trihydrate) 1gm
(Blended with Sodium Carbonate)
(USP Specifications)



Dosage:

As directed by the physician.

Instructions:

- Freshly prepared solutions of PHINPEN IV should be used.
- Not to be used if solution is not clear.
- Reconstituted should be used immediately.
- To be sold on prescription of a registered medical practitioner only.
- Protect from light and moisture.
- Keep out of the reach of children.

Storage Condition: Prior to Constitution:

- The dry powder should be stored below 30°C.

After Constitution:

- Re-constituted solution may be stored for 1 hour at up to 25°C or 15 hours at up to 5°C.
- Do not freeze the reconstituted solution.

Presentation:

1 vial of 500mg Meropenem + 10ml sterile water for injection.

MANUFACTURED BY:
NAWAN
LABORATORIES (PVT.) LTD.

136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.
Tel+ 92 21 35065835-7
Web: www.nawanlab.com



PHINPEN MEROPENEM For IV Injection

۵۰۰ ملی گرام وریدی انجکشن

اگرام وریدی انجکشن

فِن پِن انجکشن (میروپینم)

خوارک: ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

ہدایت: • تازہ تیار شدہ محلول استعمال کریں۔

• تیار شدہ محلول اگر شفاف نہ ہو تو استعمال نہ کریں۔

• دو اسٹر فیٹ ڈاکٹر کے نہجہ پر فروخت کریں۔

• روشنی اور نی سے بچائیں۔ • بچوں کی پیش سے دور رکھیں۔

اسٹورینج کنڈیشن: محلول تیار کرنے سے پہلے۔

• خشک پاؤڈر کو ۳۰ گری سے کم سینٹی گریڈ پر محفوظ کریں۔

محلول تیار کرنے کے بعد۔ • تیار شدہ محلول کو اگھنے

۲۵ ڈگری سینٹی گریڈ پر یا ۱۵ گھنٹے کے لئے

۵ ڈگری سینٹی گریڈ پر محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

• تیار شدہ محلول کو بند ہونے سے بچائیں۔